


Pie bavarde

Pica pica



CLASSE OISEAUX

ORDRE PASSÉRIFORMES

FAMILLE CORVIDÉS

DESCRIPTION

Longueur : 44 - 46 cm (avec queue).

Poids : 180 - 270 g.

Plumage adulte identique chez les deux sexes :

noir et blanc, avec longue queue graduée à reflets métalliques. Tête, poitrine, dos et bas ventre noirs. Grandes taches blanches sur les ailes, abdomen blanc. Bec noir, puissant. Pattes noires. Yeux brun foncé.

Plumage juvénile : identique à celui de l'adulte, mais plus terne.

Le mâle est plus grand que la femelle.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce sédentaire. Nicheuse.

Très territoriale. Présente dans toute la France, dans les habitats favorables.

Se réunit en groupes plus ou moins importants et en dortoirs, en automne-hiver.

HABITAT

Milieus ouverts variés : plaines avec bosquets épars, prairies, bocage, bordures des cours d'eau, zones urbanisées. Evite les massifs forestiers et les zones d'altitude. Présence de plus en plus abondante aux abords et dans les zones urbanisées.

ALIMENTATION

Omnivore et opportuniste. Se nourrit principalement au sol et dans les haies.



Régime alimentaire très varié en fonction des saisons, de l'habitat et des disponibilités : insectes, escargots, occasionnellement petits oiseaux et petits mammifères, graines, fruits... charognes.

REPRODUCTION

Monogame. Forme des couples aux liens solides.

Niche généralement en couples solitaires.

Nid dans les arbres, principalement constitué de brindilles et de branches,

Ponte : 5 à 7 œufs/ponte de mars à avril

Incubation : 21 - 22 jours.

Les jeunes restent au nid jusqu'à l'envol.

MENACES SUR L'ESPÈCE

Pas de menace particulière.

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

La très forte adaptabilité de l'espèce lui permet d'utiliser de nombreuses ressources des milieux fréquentés.

Maintien des habitats favorables : l'espèce est de plus en plus abondante aux abords et dans les zones urbanisées, suite aux disponibilités alimentaires (déchets).

Pie bavarde

Pica pica

L'objectif est de connaître la tendance démographique sur le long terme, des populations nicheuses. Ce suivi est réalisé au printemps, par des observations réalisées à partir de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits de 4 km de longueur.

FRANCE : environ 1000 circuits
CENTRE : 68 circuits.


La Pie bavarde fait partie depuis 2008 des 17 espèces suivies dans le cadre du protocole NICHEURS.

Suivi de l'abondance des NICHEURS


Les circuits sont prospectés 2 fois chaque année, en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus et vus sont notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures suivant le lever du soleil.

DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DE LA PIE BAVARDE AU PRINTEMPS 2010

en France



en région Centre



En région Centre, depuis trois années consécutives, les contacts obtenus sur cette espèce, sont assez réguliers :

- 2008 : 29 contacts
- 2009 : 26 contacts
- 2010 : 32 contacts

La pie bavarde n'étant suivie que depuis 3 années, les données disponibles ne permettent pas encore de présenter une tendance d'évolution des effectifs fiable.

En France, de 2008 à 2010, un total de 7 253 contacts (2681 auditifs et 4 572 visuels) a été obtenu sur cette espèce, dans le cadre du suivi des effectifs nicheurs.

La carte de distribution en France montre l'importance et la répartition des contacts nationaux obtenus en 2010.

L'espèce est présente partout en France, exception faite de la Corse et de quelques zones ponctuelles.