


Tourterelle turque

Streptopelia decaocto



CLASSE OISEAUX

ORDRE COLUMBIFORMES

FAMILLE COLOMBIDÉS

DESCRIPTION

Longueur : 31 - 33 cm. **Poids :** 170 - 240 g.

Plumage identique chez le mâle et la femelle adulte :

assez uniformément gris-beige clair, plus foncé sur le dos.

Les rémiges primaires sont foncées. Tête gris sable clair, avec un demi-collier noir sur la nuque.

Bec noir, yeux foncés. Queue blanche en dessous.

Juvéniles : plumage général plus brun et plus terne.

Pas de demi-collier noir.

STATUT ET RÉPARTITION

Espèce sédentaire. L'espèce est omniprésente sur le territoire français, avec une fréquentation plus faible dans quelques secteurs de montagne. Les plus fortes abondances s'observent dans le Sud-Ouest et la moitié Nord du pays.

Très commune, en particulier aux abords des milieux urbanisés.

Peu farouche.

HABITAT

Fréquente principalement les milieux urbains et ruraux :

aux abords des fermes, silos à grains, bosquets, vergers, parcs et jardins, cultures...

ALIMENTATION

Essentiellement granivore : graines diverses et baies.

Au printemps-été : graines diverses plus bourgeons floraux et insectes.



REPRODUCTION

Monogame.

Reproduction principalement de début mars à octobre, mais pratiquement toute l'année.

Nid sommaire constitué de quelques brindilles, assez plat, dans un arbre, une haie.

Ponte : Plusieurs nichées/an. 2 œufs/nid.

Incubation : 14 - 18 jours

Jeunes nidicoles (ils restent au nid jusqu'à l'envol), nourris par le « lait de pigeon » (sécrétion du jabot) durant les premiers jours.

MENACES SUR L'ESPÈCE

Pas de réelles menaces sur l'espèce qui continue sa colonisation des sites favorables.

Prédation importante sur les pontes, en particulier par les corvidés.

Perte fréquente des pontes, suite à la destruction du nid, par les intempéries, car trop sommaire et souvent mal installé.

AMÉNAGEMENTS FAVORABLES

Maintien de résidus de cultures après la récolte.

Maintien de zones arborées en limite des milieux urbanisés.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

L'objectif est de connaître la tendance démographique sur le long terme, des populations nicheuses et hivernantes. Ce suivi est réalisé au printemps et en hiver, par des observations réalisées à partir de 5 points fixes, répartis tous les km, sur des circuits de 4 km de longueur.

FRANCE : environ 1000 circuits
CENTRE : 68 circuits.

La Tourterelle turque fait partie :

- des 17 espèces suivies dans le cadre du protocole NICHEURS ;
- des 13 espèces suivies dans le cadre du protocole FLASH HIVERNANT.


Suivi de l'abondance des NICHEURS

Les circuits sont prospectés 2 fois chaque année, en avril et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus sont notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures suivant le lever du soleil.


En France, 44 960 contacts ont été notés de 1996 à 2010. La tendance globale est de +106,5 %. L'espèce est considérée en forte augmentation. En Europe, elle est aussi en augmentation en Espagne et au Royaume-Uni, mais est stable au Danemark, en Suisse, en Hollande et en Belgique.

L'espèce continue son expansion régulière en région Centre. 3 806 contacts ont été obtenus entre 1996 et 2010, soit pratiquement 8,5 % des contacts nationaux.


DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE TURQUE AU PRINTEMPS 2010 en France



en région Centre



ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE TURQUE EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2000 À 2010



L'indice d'abondance des nicheurs a connu une augmentation de 113,9 % en région Centre durant cette même période. Les populations de tourterelle turque sont considérées en augmentation modérée dans cette région.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto


Suivi de l'abondance des HIVERNANTS

Ce suivi permet d'évaluer les variations interannuelles de l'abondance et la répartition d'espèces migratrices terrestres au cours de la période d'hivernage en France.


Les observations visuelles sont réalisées sur les mêmes circuits et mêmes points qu'au printemps.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier, entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE TURQUE EN JANVIER 2010 en France



Sédentaire, la tourterelle turque est présente dans toute la France, sauf dans les milieux de montagne.




En France, 23 188 contacts hivernaux ont été obtenus durant la période 2000-2010.

L'espèce est considérée au niveau national en augmentation modérée. De 2000 à 2010, 1 780 contacts ont été obtenus de 2000 à 2010 en région Centre soit presque 8% des contacts nationaux.



© Dominique Gest

ÉVOLUTION DE L'INDICE D'ABONDANCE DE LA TOURTERELLE TURQUE EN FRANCE ET EN RÉGION CENTRE DE 2000 À 2010



Les plus fortes abondances apparaissent dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. L'espèce est considérée en augmentation moyenne.

L'évolution des indices d'abondance régionaux est bien plus en dents de scie, avec un effondrement en 2005 et en 2008.

Sur la période 2000-2010, l'indice d'abondance du suivi hivernal en région Centre, a diminué de 12,5 %. L'espèce est considérée régionalement stable.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Des tourterelles turques sont baguées chaque année, dans toute la France depuis les années 2000. En 2010, le total des tourterelles turques baguées en France s'élève à 10 942. La région Centre participe à cet effort de baguage et des agents des FDC et des SD ont, après formation préalable, posé 1 419 bagues sur cette espèce entre 2001 et 2010 :

BAGUAGE

Départements	stade poussins	stade volants
Cher	98	--
Eure-et-Loir	453	9
Indre	184	41
Indre-et-Loire	242	4
Loir-et-Cher	120	105
Loiret	108	53
Totaux	1 207	212



CONTACTS



Réseau national ONCFS / FNC / FDC
« Oiseaux de passage »
Maison Guende - rue du Musée
84390 SAULT
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.fr

Délégation Interrégionale Centre - Île-de-France
Mail : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre
Mail : frc.centre@wanadoo.fr